

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Źródło: <http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12724,Komunikat-na-temat-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow.html>

Wygenerowano: Sobota, 20 stycznia 2018, 14:02

20 stycznia 2017

Komunikat na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w związku z pojawieniem się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na Dolnym Śląsku informuje posiadaczy ferm i drobnych hodowców, że każde budzące wątpliwość zachowanie ptactwa należy zgłaszać organom Inspekcji Weterynaryjnej albo kontaktować się z terenowymi lekarzami weterynarii i podmiotami świadczącymi usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i różnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych.

Z głównych objawów HPAI u drobiu są depresja, gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków - influenzy, podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest różnicowany. Grypa ptaków (influenza) o wysokiej zjadliwości najczęściej występuje i powoduje największe straty u kur i indyków. Często stwierdzane u ptaków wolno żyjących zakażenia wirusami AI zasadniczo przebiegają bezobjawowo. Jednak ptaki te, zwłaszcza migrujące ptaki wodne są długotrwałymi nosicielami wirusa AI i stanowią potencjalne źródło zakażenia dla drobiu domowego.

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze fakt, że wektorami wirusa są ptaki wodne migrujące należy stosować się do zakazów i nakazów *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016.poz.2091)*, między innymi poleca się, aby :

- unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich,
- zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami,
- chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta,
- w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się aby, sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
- osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają używać odzieży ochronnej i obuwia, przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego budynku

oraz stosować zasady zasad higieny osobistej, w tym każdorazowe mycie rąk,

- zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności,
- w przypadku zauważenia powyższego posiadacz drobiu ma zawiadamiać organ Inspekcji Weterynaryjnej albo kontaktować się z terenowymi lekarzami weterynarii podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów.

Zgodnie z przepisami prawa, zakazuje się organizacji targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem żywego drobiu i innego ptactwa (w tym gołębie). Ponadto, zakazuje się przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży ptaków na targowiskach, jak i pojenia ptactwa wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Sytuacja w województwie dolnośląskim jest stale monitorowana przez służby weterynaryjne, a strategia kontrolowania polega na szybkim likwidowaniu postaci HPAI u drobiu w możliwie najkrótszym okresie poprzez:

- ścisłą kwarantannę, szybkie wybicie całego pogłowia drobiu w ognisku choroby, celem usunięcia źródła infekcji
- skuteczne oczyszczanie i odkażanie pomieszczeń celem usunięcia i ograniczenia obecności wirusa w środowisku,
- ścisłą kwarantannę i kontrolę przemieszczenia drobiu, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania wirusa,
- prowadzenie dochodzenia epizootycznego i perlustracji gospodarstw celem weryfikacji środowiska ,
- tworzenie stref zagrożonych i zapowietrzonych.

W załączeniu publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ulotkę informacyjną.



Zasady, których trzeba przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

▶ Załączniki do strony

[Ulotka informacyjna](#) 754.15 KB Ulotka informacyjna

[Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi](#) 169.04 KB Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom znajomego](#)

[Wstecz](#)